



Zbieranie próbek pod kątem badania na obecność wirusów ptasiej grypy

Próbki zbieramy tylko ze świeżych odchodów oraz robiąc wymaz z gardła i podniebienia ptaków wodnych i wodnoblotnych.

1. Od pojedynczego osobnika w trakcie obrączkowania:
 - a. Niewielką porcję kału nabieramy do wymazówki. Wymazówkę podpisujemy: **kloaka**, data, miejsce, nr obrączki, gatunek.
 - b. W przypadku większych gatunków (łabędzie, gęsi, kaczki, łyska, duże mewy) pobieramy wymazówką ślinę z tylnej części podniebienia (wystarczy że będzie wilgotna). Wymazówkę podpisujemy: **gardło**, data, miejsce, nr obrączki, gatunek.
2. W miejscu przebywania wielu osobników (łabędzie na plażach, krzyżówki na stawach miejskich) można zebrać próbki z 5 odchodów do jednej wymazówki umieszczając w podpisie: **odchody**, data, miejsce, gatunek z dopiskiem **x5**.

UWAGA. W wymazówce może być próbka od 1 lub od 5 osobników (nie od 2 czy np. 3).

Próbki w ciągu 2 (maksymalnie 3) dni trzeba wysłać do Instytutu Weterynarii w Puławach. Zaleca się, by wymazówki przed włożeniem do koperty były wsadzone do worka foliowego typu ZIP. Jeśli ma się tylko 1 próbkę – wywalić. Jeśli więcej – wysłać, wrzucając zaadresowaną kopertę do skrzynki pocztowej. Zaadresowane koperty, worki foliowe i wymazówki do odebrania u koordynatora projektu.

Włodzimierz Meissner